Parc national du Mercantour

# ABC Atlas de la Biodiversité Communale

## St. Sauveur-sur-Tinée

Forêt d'altitude

Rapace nocturne

### Nyctale de Tengmalm
(Aegolius funereus)

Lorsqu'il est actif, le Tengmalm montre surtout son "air étonné" depuis son ancienne loge de pic noir. Forestière, elle apprécie les vallées possédant un équilibre mâle/femelle.

Les jeunes ont un plumage brun discret.

© G. Deluermoz/PNM

Plante à fleurs

### Violette d'Argentera
(Viola argenteria)

Plante fournant parfois de larges touffes prostrées.

Se trouve surtout en Corse, quasi le Mercantour faisait exception et que la Méditerranée ménagistait pas encore.

© F. Guigo/PNM

Feuilles entières en cœur à la base.

Ebours

Passereau

### Linotte mélodieuse
(Linaria cannabina)

Le plumage de la femelle est discret.

Bec court et conique de granivore

Mâle au plumage nuptial très coloré.

© J. Blanc

Se reproduit en milieu semi-ouvert diffusé.

⚠ Espèce menacée

Cervidé

Bois en croissance (velours).

Les bois des mâles tombent chaque année (fin d'hiver-début du printemps) et repoussent dans l'été. Ils servent, pendant la période de rut, à attirer les femelles.

### Cerf élaphe
(Cervus elaphus)

Femelle et jeune faon.

© E. Malthieu/PNM

Les populations de cerfs se remettent de 1000 à 2000 m d'altitude, dans les prairies, forêts et falaises.

Plante à fleurs

### Violette d'Argentera
(Viola argenteria)

Plante formant parfois de larges touffes prostrées.

Se trouve surtout en Corse, quasi le Mercantour faisait exception et que la Méditerranée ménagistait pas encore.

© F. Guigo/PNM

Feuilles entières en cœur à la base.

Ebours

### Hélicon du Mercantour
(Chilostoma milleri)

⚠ Espèce quasi menacée

Gastéropode

Cet escargot endémique se rencontre dans les chaos de gros blocs rocheux non calcaires, en altitude de 1000 m d'altitude, et descend de 600m.

20 mm

© F. Guigo/PNM

Vivérridé

### Genette
(Genetta genetta)

Espèce nocturne très discrète, originaire d'Afrique du Nord, ayant colonisé l'Europe lors des anciennes époques du Moyen-Âge.

Un guest des observations à l'échelle du Parc national du Mercantour a été réalisé sur la commune.

© M. Coulon/PNEcrins

Prairie sèche

Espèce diurne noire caractéristique rencontrée dans les prairies de l'adret.

Ce criquet vole fréquente les hautes herbes de prairies plus sèches.

19 à 21 mm pour le mâle

⚠ Espèce vulnérable

Orthoptère

### Criquet des roseaux
(Mecostethus parapleurus)

Les yeux unis de l'extérieur en un point.

Odonate

### Cordulégastre bidenté
(Cordulegaster bidentata)

Vol de juin à septembre.

Cette grande libellule se reproduit dans les sources tufeuses, les ruisseaux, résurgences et suintement en forêt de litière collinéen et montagnard.

La livrée vit entre 2 ans et 5 ans dans les sédiments calmes où elle chasse à l'affut.

⚠ Espèce menacée

Elle est sensible à l'empoissonnement forestier.

Source

Amphibien

### Spélerpès de Strinati
(Speleomantes strinatii)

© M. Ancey/PNM

Endémique des Alpes-Maritimes où on le trouve en montagne et en région peu éloignée.

Yeux globuleux proéminents, caractéristiques des animaux vivant en semi-obscurité.

Langue protractile en fleuve de chasse pour capturer insectivores et araignées.

⚠ Espèce quasi menacée

Doigts palmés à la base.

Cavité naturelle ou artificielle

Abord de village

© L. Arthur

Les bâtiments abandonnés représentent des gîtes favorables pour la reproduction et peuvent abriter des colonies remarquables.

### Pipistrelle commune
(Pipistrellus pipistrellus)

Chiroptère

Tragus arrondi et incurvé vers l'intérieur.

© E. Ustun

### Vanesse des pariétaires
(Polygonia egea)

Lépidoptère

Sa plante hôte est Parietaria officinalis.

Ce papillon est parmi les plus menacés et les plus rares de France. On le retrouve pourtant dans le village sur les murets couverts de pariétaire.

Il vole de mi à septembre en deux générations.

⚠ Espèce menacée

Rivière de fond de vallée

### Anguille d'Europe
(Anguilla anguilla)

Poisson

Nageoires dorsale, anale et caudale fusionnées en une nageoire unique et continues, démunies des nageoires.

Corps serpentiforme de 45 cm à 140 cm.

Mâchoire inférieure plus longue que la supérieure

Petites cuvettes branchiales

⚠ En danger critique d'extinction sur toutes surfaces européen et national

Les populations européennes ont décliné de 90 % à 95 % depuis 1940 du fait de la dégradation des habitats (obstacles aux migrations, pollutions dont PCB, aménagements des rivières), parasites, agents pathogènes et changements climatiques.

Illustration graphisme : Frédérique Himery